

ZEMOLEZ KAMČATSKÝ

Lonicera kamtschatica

Rod *Lonicera* zahŕňa vyše 200 druhov väčšinou využívaných v okrasnom záhradníctve. Z hľadiska pestovania pre plody sa v ostatných rokoch objavili viaceré odrody jedlých zemolezov *L. kamtschatica* a *L. edulis*. Pôvodné druhy pochádzajú z ďalekého východu. U nás kvitne v priebehu apríla, ale nie je poškodzovaný mrazmi. Rastlina vydrží až -45°C , kvety nezmrznú ani pri -8°C . Najväčším pozitívom je extrémne skoré dozrievanie plodov. Prvé plody dozrievajú už v polovici mája a sú prakticky prvým čerstvým ovocím dozrievajúcim v našich klimatických podmienkach. Sú podlhovasté dužinaté kôstkovičky modrofialovej farby o hmotnosti 0,8–2,0g, šírke 0,8–1,2 a dĺžke 1,5–3 cm. Sú šťavnaté, chuťou pripomínajú sladko-kyslé čučoriedky. Plody sú cenným zdrojom biologických látok priaznivo pôsobiacich na ľudský organizmus ako sú pektíny, vitamín C, vitamíny skupiny B, farbivá (hlavne antokyány) a iné. Z pestovateľského hľadiska nie sú náročné na výber stanovišťa – optimálna je vlhšia hlinito-piesočnatá alebo piesočnato-hlinitá pôda, ale znášajú aj mierne sucho. Na pH pôdy nemajú špecifické požiadavky, vyhovuje im mierne kyslá pôda. Netrpia chorobami ani škodcami. Rastlina tvorí hustý ker dorastajúci do výšky 1,5 – 2,5 m. Pred výsadbou je vhodné obohatiť pôdu rozloženým kompostom v dávke 10 – 15 kg na rastlinu, prihnojenie opakujeme každé 2 – 3 roky. Ako minerálnu výživu používame cca 20g/m² superfosfátu a draselnej soli na jeseň a dve dávky dusičnanu amónneho 20 – 30 g/m² (veľmi skoro na jar a po odkvitnutí). Rez do 5 rokov sa obmedzuje na sanitárny rez (odstraňovanie vylomených a poškodených výhonov), neskôr režeme slabé a prestarnuté konáre, aby bola zabezpečená pravidelná obnova rodivého obrastu. Pre kvalitnejšie opelenie je lepšie vysádzať dve odrody. Pri správnom pestovaní by mal ker dosiahnuť plnú rodivosť v 4.-5. roku po vysadení.

